

Problema 0552: Calcula los gramos de CO₂ que se obtienen al hacer reaccionar 15g de CH₄ con 55g de O₂.

Escribimos la ecuación química ajustada, debajo los moles de las sustancias y debajo el dato y la incógnita del problema, pero si nos dan dos datos debemos determinar cuál es el reactivo limitante, es decir, el que está en menor proporción:

$$CH_{4(g)} + 2 O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2 H_2 O_{(l)}$$
1 mol 2 mol 1 mol 2 mol

15g 55g x (g)

Para saber cuál es el reactivo limitante basta saber el número de moles de cada sustancia, en el caso de que los coeficientes estequiométricos sean todos unidad, si no es así dividimos el número de moles entre el coeficiente estequiométrico para que sean comparables.

$$\frac{n_{CH_4}}{coef.} = \frac{\frac{15 g}{16 g/mol}}{1} = 0.94 \qquad \frac{n_{O_2}}{coef.} = \frac{\frac{55 g}{32 g/mol}}{2} = 0.86$$

La sustancia que presente el valor más bajo de este cociente será el reactivo limitante, en este caso es el O₂. Una vez que sabemos cuál es el reactivo limitante hacemos los cálculos sólo con esta sustancia, nos olvidamos de la otra que estará en exceso.

Las cantidades de las sustancias que participan en una ecuación química son magnitudes directamente proporcionales. Si tenemos más reactivo obtendremos más producto. Resolvemos con una proporción o utilizando factores de conversión:

Método a) Proporción:

$$\frac{x(g)CO_2}{55gO_2} = \frac{44gCO_2}{2 \cdot 32gO_2} \qquad x(g)CO_2 = \frac{44gCO_2 \cdot 55gO_2}{2 \cdot 32gO_2} = \frac{37,81gCO_2}{2}$$

Método b) Factores de conversión

Partimos del dato y llegamos a la incognita a través de la relación entre los moles

$$55gO_2 \cdot \frac{1 \, mol\, O_2}{32 \, g\, O_2} \cdot \frac{1 \, mol\, CO_2}{2 \, mol\, O_2} \cdot \frac{44 \, g\, CO_2}{1 \, mol\, CO_2} = \frac{37,81 \, g\, CO_2}{1 \, mol\, CO_2}$$