

Problema 443: Calcula la variación de entalpía normal de la reacción a partir de las entalpías de formación de las tablas termodinámicas:



Podemos calcular la entalpía normal de una reacción utilizando las entalpías normales de formación de las sustancias que participan en ella y que encontramos en las tablas de química.

$$\Delta H^{\circ}_R = \sum n_p \cdot \Delta H^{\circ}_{f \text{ prod}} - \sum n_r \cdot \Delta H^{\circ}_{f \text{ react}}$$

Esta ecuación es aplicación de la Ley de Hess, recuerda que necesitas la ecuación química ajustada, que las sustancias en estado acuoso o disueltas tienes que disociarlas y que las entalpías de los elementos en su estado estándar son nulas por definición de entalpía de formación.



$$\Delta H^{\circ}_R = \sum n_p \cdot \Delta H^{\circ}_{f \text{ prod}} - \sum n_r \cdot \Delta H^{\circ}_{f \text{ react}}$$

$$\Delta H^{\circ}_R = 1 \text{ mol} \cdot \Delta H^{\circ}_f [\text{NH}_4^+_{(aq)}] + 1 \text{ mol} \cdot \Delta H^{\circ}_f [\text{Cl}^-_{(aq)}] - 1 \text{ mol} \cdot \Delta H^{\circ}_f [\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}]$$

$$\Delta H^{\circ}_R = 1 \text{ mol} \cdot \left(-132,4 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\right) + 1 \text{ mol} \cdot \left(-167,1 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\right) - 1 \text{ mol} \cdot \left(-315,5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\right) = \underline{\underline{+16,0 \text{ kJ}}}$$

Sustituimos en la ecuación las sustancias que son productos y reactivos, eliminamos las que se repiten como productos y reactivos y las que tienen valor cero por definición, sustituimos los valores para cada sustancia y calculamos el resultado que acompañaremos de las unidades.